

## Preguntas frecuentes sobre NGENLA



### 1 ¿Qué es NGENLA?

NGENLA es un tratamiento de una vez por semana que puede ayudar a su hijo o hija con deficiencia de la hormona del crecimiento pediátrica (DHCp) a alcanzar su estatura completa. Requiere menos inyecciones que el tratamiento de hormona del crecimiento diario, y es una alternativa tanto para los padres como para los hijos o hijas.

### 2 ¿Por qué elegir un tratamiento de una vez por semana sobre un tratamiento diario?

El tratamiento de una vez al día requiere 365 inyecciones al año. NGENLA una vez por semana requiere 52 inyecciones al año. Esto equivale a cerca de un 85% menos inyecciones, y resultados similares en cuanto a estatura y efectos secundarios que el tratamiento de hormona del crecimiento diario.

### 3 ¿Hay disponibles programas de ahorros en el copago?

Un plan sencillo cubre los copagos y deducibles para NGENLA, con ofrecimientos de ahorros de hasta \$6,000 al año. Los pacientes elegibles con seguro comercial pudieran pagar tan poco como \$0 por receta.\*

\*Ahorros anuales de hasta \$6,000. Los beneficiarios de programas estatales y federales no son elegibles.

Vea los términos en [NGENLA.com/resources](http://NGENLA.com/resources).

### 4 ¿Cómo me aseguro de recordar mi próxima dosis?

Pfizer, los manufactureros de NGENLA, ofrece un programa de apoyo al paciente que le enviará recordatorios de la dosis por texto. Para inscribirse para recibir estos recordatorios, envíe el texto **NGENLA al 46286**.

Vea los Términos y Condiciones en [engagedrx.com/pghd](http://engagedrx.com/pghd). Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. La frecuencia de los mensajes puede variar. Envíe el texto HELP (AYUDA) para obtener información, STOP (PARAR) para dejar de recibir mensajes. Puede encontrar la Política de Privacidad de Pfizer en [pfizer.com/privacy](http://pfizer.com/privacy).

## INDICACIÓN

NGENLA es un producto recetado para el tratamiento del retraso del crecimiento en niños de 3 años o más que no producen suficiente hormona del crecimiento por sí solos. Este padecimiento se conoce como deficiencia de la hormona del crecimiento, DHC (GHD, por sus siglas en inglés).

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No debe usar la hormona del crecimiento en niños una vez hayan cerrado las placas de crecimiento.

No debe usar la hormona del crecimiento en niños con algunos tipos de problemas visuales causados por la diabetes (retinopatía diabética).

No debe usar la hormona del crecimiento en niños con cáncer u otros tumores.

No debe usar la hormona del crecimiento en niños gravemente enfermos debido a

### 5 ¿Cómo doy seguimiento al progreso de mi hijo o hija?

Un imán de recordatorio y una tabla de crecimiento son 2 artículos que se encuentran en el Paquete de Inicio para el Paciente que pueden ayudarle a mantenerse en el tratamiento de las inyecciones y dar seguimiento al progreso. [Haga clic aquí](#) para inscribirse en el programa del Navegador de NGENLA y reciba su Paquete de Inicio para el Paciente.



### 6 ¿Tiene mi hijo o hija que aplicarse NGENLA a una hora específica del día?

NGENLA una vez por semana puede aplicarse a cualquier hora, de día o de noche. Usted decide la mejor hora para usted y su hijo o hija.

### 7 ¿Es la pluma de NGENLA fácil de usar?

NGENLA usa los últimos avances en plumas para inyección de uso en el hogar. Como las plumas son precargadas, proveen a los usuarios una manera de administración más conveniente que el uso de un vial y jeringuilla.

### 8 ¿Qué debo hacer si mi hijo o hija presenta una reacción en el área de inyección?

Si su hijo o hija presenta una reacción en el área de inyección, consulte la [Información de Prescripción completa](#).

[Conozca cómo usar NGENLA](#)



algunos tipos de cirugía de corazón o estómago, trauma o problemas respiratorios.

No debe usar la hormona del crecimiento en niños con el síndrome de Prader-Willi que están muy sobrepeso o tienen problemas respiratorios, incluida apnea del sueño.

No debe usar NGENLA en niños que han presentado una reacción alérgica a somatotropin-ghla o a algún ingrediente de NGENLA. Busque atención médica inmediata en caso de una reacción alérgica.

Algunos niños han desarrollado diabetes mellitus cuando usan la hormona del crecimiento. Puede ser necesario ajustar la dosis de los medicamentos contra la diabetes durante el tratamiento con NGENLA. Deben vigilarse minuciosamente los niños que reciben NGENLA junto con terapia de glucocorticoídes y/u otros medicamentos que el cuerpo procesa de la misma manera.

[Consulte la Información de Seguridad Seleccionada adicional en la próxima página y la Información de Prescripción completa](#).

## 9 ¿Qué sucede si mi hijo o hija necesita más de una inyección?

Si su hijo o hija requiere más medicamento de lo que provee una sola inyección, pudiera ser necesario usar múltiples inyecciones. Si una pluma contiene menos de una dosis completa del medicamento, puede dividir la dosis entre la pluma vieja y la nueva. En ambas situaciones, es necesario usar una aguja nueva para cada inyección. Solo divida o duplique la dosis después de haber recibido el adiestramiento o la recomendación de su profesional de la salud. Cada inyección debe administrarse en un área de inyección distinta.

## 10 ¿Quién no debe recibir NGENLA?

Los niños no deben recibir NGENLA si le aplica alguno de los siguientes:

- Sus placas de crecimiento han cerrado
- Si padecen de cáncer activo
- Si se conoce que presentan reacciones alérgicas o autoinmunitarias a NGENLA
- Si padecen de una enfermedad aguda grave debido a complicaciones después de una cirugía de corazón abierto o abdominal, trauma accidental múltiple o insuficiencia respiratoria aguda
- Si padecen de diabetes con determinados tipos de retinopatía diabética (problemas visuales)
- Si padecen del síndrome de Prader-Willi, tienen obesidad severa o problemas respiratorios, entre ellos, apnea del sueño (dejar de respirar momentáneamente durante el sueño)

## 11 ¿Qué sucede si mi hijo o hija necesita un cambio de dosis?

NGENLA está disponible en 2 concentraciones de dosis distintas: 24 mg y 60 mg. La dosis apropiada está basada en el peso corporal de su hijo o hija y será determinada por su médico.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

En sobrevivientes de cáncer en la niñez, el tratamiento con la hormona del crecimiento puede aumentar la probabilidad de un tumor nuevo, en particular, algunos tumores cerebrales benignos (no cancerosos). Esta probabilidad puede ser más alta en niños que recibieron radiación al cerebro o la cabeza. El profesional de la salud de su hijo o hija debe verificar la posibilidad de la recurrencia de cáncer o un tumor.

Los niños tratados con la hormona del crecimiento han presentado aumento de presión en el cerebro. Si su hijo o hija presenta dolores de cabeza, problemas visuales, náuseas (sensación de vomitar) o vómitos, comuníquese con el profesional de la salud de su hijo o hija.

NGENLA puede disminuir los niveles de las hormonas tiroideas. Una disminución de los niveles de las hormonas tiroideas puede cambiar cuán bien NGENLA funciona.

El profesional de la salud de su hijo o hija le hará análisis de sangre para verificar los niveles de hormonas de su hijo o hija.

Se debe examinar con regularidad a los niños tratados con la hormona del crecimiento por la posibilidad de niveles séricos bajos de cortisol y/o la necesidad de aumentar la dosis de los glucocorticoides que usan.

En niños que experimentan crecimiento rápido, puede ocurrir desarrollo o empeoramiento de la curvatura de la columna vertebral. Esto también se conoce como escoliosis. Se deben vigilar regularmente a los pacientes con escoliosis para asegurar que la escoliosis no

## 12 ¿A qué efectos secundarios debo estar pendiente?

Los efectos secundarios más comunes informados en los estudios clínicos principales fueron reacciones en el área de inyección, resfriado común, fiebre y dolor de cabeza.

## 13 ¿Cómo debo guardar NGENLA?

Guarde las plumas de NGENLA en el refrigerador entre 36°F a 46°F [2°C a 8°C].

**Nota:** Para que la inyección se sienta más cómoda, puede esperar a que la pluma alcance temperatura ambiente (por hasta 30 minutos) antes de aplicársela a su hijo o hija.

## 14 ¿Cómo puedo viajar/volar con NGENLA?

Antes de volar con NGENLA, verifique con la línea aérea, ya que las reglas en cuanto a volar con medicamentos o neveritas pueden variar.

**Consejo:** Coteje las guías de TSA para información respecto a viajar con agujas.

Inscríbase en el programa  
del Navegador de NGENLA



(somatotropin-ghlal) injection

empeore durante la terapia con la hormona del crecimiento.

Use un área del cuerpo distinta para cada inyección. Esto puede ayudar a evitar problemas de la piel como bultos o dolor.

El tratamiento con la hormona del crecimiento puede causar dolor estomacal (abdominal) grave y constante. Esto pudiera ser signo de pancreatitis. Infórmale al profesional de la salud de su hijo o hija el surgimiento de dolor estomacal (abdominal) nuevo.

En estudios de NGENLA en niños con deficiencia de la hormona del crecimiento (DHC), los efectos secundarios incluyeron reacciones en el área de la inyección, como dolor, hinchazón, erupción, picor o sangrado.

Otros efectos secundarios fueron resfriado común, dolor de cabeza, fiebre (temperatura alta), recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), tos, vómitos, disminución de niveles de hormonas tiroideas, dolor estomacal, erupción o dolor de garganta.

Un profesional de la salud le ayudará con la primera inyección. También, le dará adiestramiento respecto a cómo inyectar NGENLA.

Solo con receta

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada adicional en la página anterior y la Información de Prescripción completa.