

## Comenzando en NGENLA una vez por semana



No es un paciente real.



Los niños que usaron NGENLA una vez por semana por 1 año manifestaron un ritmo de crecimiento promedio similar a niños tratados diariamente con hormona del crecimiento.



### INDICACIÓN

NGENLA es un producto recetado para el tratamiento del retraso del crecimiento en niños de 3 años o más que no producen suficiente hormona del crecimiento por sí solos. Este padecimiento se conoce como deficiencia de la hormona del crecimiento, DHC (GHD, por sus siglas en inglés).

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No debe usar la hormona del crecimiento en niños una vez hayan cerrado las placas de crecimiento.

No debe usar la hormona del crecimiento en niños con algunos tipos de problemas visuales causados por la diabetes (retinopatía diabética).

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la Información de Prescripción completa.

## EMPECemos A CRECER CON NGENLA UNA VEZ POR SEMANA

### Un tratamiento para una vez por semana para niños con deficiencia de la hormona del crecimiento pediátrica (DHCp)

Bienvenidos a la emocionante próxima etapa del crecimiento de su hijo o hija! Su trayectoria con el diagnóstico y la decisión de comenzar tratamiento pueden haber traído momentos de retos y emociones. Este folleto tiene el propósito de ayudarle a contestar algunas de las preguntas que pueda tener sobre NGENLA.

#### ¿Qué es NGENLA?

NGENLA es una hormona del crecimiento que se inyecta una vez por semana. Se usa en niños que no producen suficiente hormona del crecimiento natural para crecer de forma normal. Este padecimiento se conoce como DHCp.

Por muchos años, la terapia de la hormona del crecimiento se ha usado para tratar la DHCp. Hasta hace poco, todas las terapias de la hormona del crecimiento requerían inyecciones todos los días.

**En un estudio clínico de niños con deficiencia de la hormona del crecimiento, NGENLA ayudó a alcanzar resultados de estatura similar igual que la hormona del crecimiento administrada diariamente...con solo una inyección por semana.**

Usted y su hijo o hija pueden inyectar NGENLA usando una jeringuilla precargada lista para usar sin que requiera mezclarse.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No debe usar la hormona del crecimiento en niños con cáncer u otros tumores.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la [Información de Prescripción completa](#).

**UNA VEZ  
POR SEMANA**

¿CUAL ES SU RUTINA  
CON NGENLA?

Busque estas notas a lo largo del folleto para encontrar maneras de apoyar su rutina con NGENLA.



## TABLA DE CONTENIDO

Qué necesita saber antes de que su hijo o hija use NGENLA.....	4
Información de estudios clínicos de NGENLA.....	5
Qué esperar .....	6
Cómo usar NGENLA por primera vez .....	7
La dosis semanal de su hijo o hija.....	8
Conozca la pluma de NGENLA .....	9
Manténgala fría (como guardar NGENLA) .....	10
Cómo hacer que NGENLA forme parte de su rutina familiar .....	12
El día de la dosificación de NGENLA de su hijo o hija.....	13
Cómo cambiar el día de la dosificación de NGENLA o manejar una dosis omitida.....	14
Encuentre apoyo en el Pfizer Bridge Program® .....	16

No es un paciente real.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la Información de Prescripción completa.



**ngenla™**  
(somatrogan-ghla) injection



## LO QUE DEBE SABER ANTES DE QUE SU HIJO O HIJA USE NGENLA

Su médico ha tomado en cuenta el cuadro de salud completo de su hijo o hija para asegurarse de que NGENLA es adecuado para él o ella. Los siguientes son algunos factores que debe tener presente según su hijo o hija continúa en tratamiento.



### Los niños no deben usar NGENLA si le aplica alguno de los siguientes:

- Sus placas de crecimiento han cerrado
- Si padecen de cáncer activo
- Si presentan reacciones alérgicas o autoinmunitarias a NGENLA
- Si padecen de una enfermedad aguda grave debido a complicaciones después de una cirugía de corazón abierto o abdominal, trauma accidental múltiple o insuficiencia respiratoria aguda
- Si padecen de diabetes con determinados tipos de retinopatía diabética (problemas visuales)
- Si padecen del síndrome de Prader-Willi, tienen obesidad severa o problemas respiratorios, entre ellos, apnea del sueño (dejar de respirar momentáneamente durante el sueño)

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No debe usar la hormona del crecimiento en niños gravemente enfermos debido a algunos tipos de cirugía de corazón o estómago, trauma o problemas respiratorios.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la [Información de Prescripción completa](#).

No es un paciente real.

  
**ngenla™**  
(somatotropin-ghla) injection

## Déjale saber al médico si su hijo o hija:

- Usa otros medicamentos. El médico de su hijo o hija pudiera tener que ajustar las dosis de algunos medicamentos
  - Entre estos se incluyen los glucocorticoides o insulina
- Recientemente tuvo o tendrá una cirugía importante

## INFORMACIÓN DE ESTUDIOS CLÍNICOS DE NGENLA

NGENLA fue estudiado en un ensayo clínico principal por 12 meses en 224 pacientes pediátricos con deficiencia de la hormona del crecimiento.

El estudio comparó a NGENLA con una hormona del crecimiento usada una vez al día. El propósito del estudio fue conocer cómo crecían los niños después de 1 año usando NGENLA en comparación con niños que usaron la hormona del crecimiento diariamente. Los resultados demostraron que el ritmo de crecimiento de los niños que recibieron NGENLA fue similar al ritmo de crecimiento de los niños que recibieron hormona del crecimiento una vez al día.

**Este estudio demostró que NGENLA es eficaz y posee un perfil de seguridad aceptable similar a la hormona del crecimiento de uso diario en niños.**

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No debe usar la hormona del crecimiento en niños con el síndrome de Prader-Willi que están muy sobrepeso o tienen problemas respiratorios, incluida apnea del sueño.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la Información de Prescripción completa.



### SU DÍA DE NGENLA

Una manera de lograr hacer un hábito es unirlo a otros hábitos. Entonces, si hay algo que hace todas las semanas, considere añadir NGENLA al itinerario de ese día.



## QUÉ DEBE ESPERAR

Al igual que otros medicamentos, NGENLA puede causar efectos secundarios. Se observaron algunos efectos secundarios graves, pero ninguno estuvo relacionado con el medicamento del estudio. La mayor parte de los niños toleraron NGENLA bien. Solo 1 niño suspendió el uso de NGENLA debido a efectos secundarios.

En el estudio clínico de NGENLA, fueron comunes las reacciones en el área de inyección, como dolor, hinchazón, erupción, picor y sangrado. La mayor parte del dolor fue leve o moderado y disminuyó con el tiempo.

Otros efectos secundarios comunes fueron resfriado común, dolor de cabeza, fiebre (temperatura alta), recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), tos, vómitos, disminución de los niveles de hormonas tiroideas, dolor estomacal, erupción y dolor de garganta.

Converse con el médico o enfermero de su hijo o hija respecto a cualquier efecto secundario que tenga su hijo o hija mientras recibe NGENLA.



### Converse con el médico de su hijo o hija de inmediato si:

- Su hijo o hija presenta cambios de visión o dolores de cabeza fuertes/frecuentes que pudieran ocurrir con náuseas o vómitos, en especial temprano en el tratamiento. Estos pudieran ser signos de aumento temporal en la presión de la sangre del cerebro
- Su hijo o hija cojea o presenta dolor de cadera o rodilla que ocurre durante el crecimiento

Durante el tratamiento con NGENLA, el médico verificará el azúcar en la sangre de su hijo o hija y la función tiroidea. Los niveles bajos de hormonas tiroideas deben tratarse antes de comenzar NGENLA.



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No debe usar NGENLA en niños que han presentado una reacción alérgica a somatrogan-ghla o a algún ingrediente de NGENLA. Busque atención médica inmediata en caso de una reacción alérgica.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la [Información de Prescripción completa](#).

  
nGenla™  
(somatrogan-ghla) injection

## CÓMO USAR NGENLA POR PRIMERA VEZ

Antes de usar NGENLA por primera vez, su médico o enfermero le mostrará cómo usarlo. Asegúrese de sentirse cómodo con los pasos para aplicar la inyección antes de usar NGENLA. Repase las Instrucciones de Uso detalladas que se proveen con la pluma de NGENLA.

Su médico al igual que las Instrucciones de Uso completas le mostrarán como hacerlo:

- Paso 1**  Prepárese para la inyección, incluidos los pasos adicionales cuando usa una pluma nueva por primera vez
- Paso 2**  Fije la dosis recetada
- Paso 3**  Inyecte su dosis
- Paso 4**  Termine desechando la aguja y guardando la pluma

Haga [clic aquí](#) para obtener instrucciones detalladas sobre el uso de NGENLA.



No es un paciente real.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Algunos niños han desarrollado diabetes mellitus cuando usan la hormona del crecimiento. Puede ser necesario ajustar la dosis de los medicamentos contra la diabetes durante el tratamiento con NGENLA. Deben vigilarse minuciosamente los niños que reciben NGENLA junto con terapia de glucocorticoides y/u otros medicamentos que el cuerpo procesa de la misma manera.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la [Información de Prescripción completa](#).

  
**ngenla™**  
(somatotropin-ghla) injection



## Además de su pluma de NGENLA, necesitará lo siguiente

- Una aguja estéril nueva para cada inyección. NGENLA se inyecta usando una aguja fina bien pequeña (calibre 31 a 32). Estas no se incluyen con la pluma precargada. Converse con su médico, enfermero o farmacéutico sobre la aguja correcta para su hijo o hija
- Toallitas de alcohol, bolitas de algodón o gasas y un vendaje adhesivo
- Un envase para el desecho de objetos punzantes adecuado para desechar las agujas de las plumas y las plumas

## LA DOSIS SEMANAL DE SU HIJO O HIJA



El médico le ha recetado la dosis correcta de NGENLA según el peso de su hijo o hija. Conocer la dosis de su hijo o hija es importante. Usará la dosis para ajustar el tratamiento de su hijo o hija con la pluma de NGENLA.

Anote la dosis de su hijo o hija.

\_\_\_\_\_ mg

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

En sobrevivientes de cáncer en la niñez, el tratamiento con la hormona del crecimiento puede aumentar la probabilidad de un tumor nuevo, en particular, algunos tumores cerebrales benignos (no cancerosos). Esta probabilidad puede ser más alta en niños que recibieron radiación al cerebro o la cabeza. El profesional de la salud de su hijo o hija debe verificar la posibilidad de la recurrencia de cáncer o un tumor.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la Información de Prescripción completa.



## CONOZCA LA PLUMA DE NGENLA

NGENLA está disponible en 2 tamaños de plumas: 24 mg y 60 mg. Su médico eligió el tamaño de la pluma para su hijo o hija a base de la dosis de NGENLA. Cada pluma de NGENLA está precargada con varias dosis y debe desecharse de forma apropiada cuando esté vacía. Solo debe usarla su hijo o hija.

No requiere mezclar—el medicamento NGENLA en la pluma precargada está listo para usar!

### Adherir la aguja

Debe adherir una aguja estéril nueva para cada dosis. Deseche la aguja después de cada inyección.




Para más información sobre su pluma de NGENLA, consulte las **Instrucciones de Uso** en la **Información de Prescripción**.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Los niños tratados con la hormona del crecimiento han presentado aumento de presión en el cerebro. Si su hijo o hija presenta dolores de cabeza, problemas visuales, náuseas (sensación de vomitar) o vómitos, comuníquese con el profesional de la salud de su hijo o hija.

Consulte la **Información de Seguridad Seleccionada** a lo largo de este folleto y la **Información de Prescripción completa**.



**ngenla™**  
(somatotropin-ghla) injection



No es un paciente real.

## MANTÉNGALO FRÍO (COMO GUARDAR NGENLA)



### Antes de usarlo por primera vez:

- Guarde en el refrigerador de 36°F a 46°F (2°C a 8°C)
- Mantenga la pluma en su caja original protegida de la luz solar directa
- Puede usar una pluma no usada hasta la fecha de vencimiento impresa en la etiqueta de la pluma, si la mantiene en el refrigerador

### Después del primer uso:

- Guárdela por hasta 28 días refrigerada de 36°F a 46°F (2°C a 8°C)
- Guárdela protegida de la luz solar directa
- Antes de guardarla, quite y deseche la aguja y vuelva a colocar la tapa de la pluma
- Si la pluma está vacía o han pasado más de 28 días después de usada por primera vez, deséchela, aunque le quede medicamento no usado

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

NGENLA puede disminuir los niveles de las hormonas tiroideas. Una disminución de los niveles de las hormonas tiroideas puede cambiar cuán bien NGENLA funciona. El profesional de la salud de su hijo o hija le hará análisis de sangre para verificar los niveles de hormonas de su hijo o hija.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la [Información de Prescripción completa](#).

  
**ngenla™**  
(somatrogan-ghla) injection



¡Puede viajar con NGENLA también!

Si necesita viajar y llevarse su NGENLA:

- Guárdelo en su caja original en un envase aislado entre 36°F a 46°F (2°C a 8°C)
- Una vez llegue, coloque su pluma en un refrigerador cuanto antes
- No la deje en el carro u otro lugar que pueda ponerse muy caliente o muy fría

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Se debe examinar con regularidad a los niños tratados con la hormona del crecimiento por la posibilidad de niveles bajos de cortisol y/o la necesidad de aumentar la dosis de los glucocorticoides que usan.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la [Información de Prescripción completa](#).



  
**ngenla™**  
(somatotropin-ghla) injection

## CÓMO HACER QUE NGENLA FORME PARTE DE LA RUTINA FAMILIAR

Al su hijo o hija comenzar el tratamiento, ese es un buen momento para empezar a pensar sobre las maneras para mantenerse en el tratamiento por el tiempo que su hijo o hija lo necesite. Y hay una buena razón para esto. Usar la hormona del crecimiento según recetada ha demostrado que ayuda a los niños a sacarle el mayor provecho al tratamiento.

**Podrá ayudar a dirigir a su hijo o hija a alcanzar el éxito encontrando maneras de integrar a NGENLA a su rutina familiar.**



No es un paciente real.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

En niños que experimentan crecimiento rápido, puede ocurrir desarrollo o empeoramiento de la curvatura de la columna vertebral. Esto también se conoce como escoliosis. Se deben vigilar regularmente a los pacientes con escoliosis para asegurar que la escoliosis no empeore durante la terapia con la hormona del crecimiento.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la [Información de Prescripción completa](#).

ngenla™  
(somatotropin-ghla) injection



## EL DÍA DE LA DOSIS DE NGENLA DE SU HIJO O HIJA

Escoja un día para la dosis de NGENLA que se ajuste a su rutina familiar.

Lleve constancia de cómo usted y su hijo o hija se han ajustado a la rutina semanal con NGENLA.

- Esté pendiente a qué cosas ayudan a su rutina de NGENLA y qué tienden a interrumpirla. Esto le ayudará a ajustar su rutina según sea necesario



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Use un área distinta del cuerpo para cada inyección. Esto puede ayudar a evitar problemas de la piel como bulto o dolor.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la Información de Prescripción completa.



## QUÉ HACER CUANDO SE OMITE UNA DOSIS

Si omite una dosis, puede seguir usando NGENLA siempre y cuando no hayan pasado más de 3 días de la dosis omitida. Luego, puede volver al itinerario de dosificación regular de su hijo o hija de una vez por semana.

- Si han pasado más de 3 días, salte la dosis omitida y administre la próxima dosis el día regular que había programado

## SELECCIONAR UN DÍA NUEVO PARA LA DOSIFICACIÓN DE NGENLA

Si decide cambiar el día de la dosificación, es importante recordar que:

- El tiempo entre 2 dosis es 3 días
- Debe continuar con la dosificación de una vez por semana después de seleccionar un día nuevo para la dosis

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

El tratamiento con la hormona del crecimiento puede causar dolor estomacal (abdominal) grave y constante. Esto pudiera ser signo de pancreatitis. Infórmale al profesional de la salud de su hijo o hija el surgimiento de dolor estomacal (abdominal) nuevo.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la [Información de Prescripción completa](#).



**¿Desea recibir recordatorios para la dosificación en su teléfono?**

Envíe el texto **NGENLA** al **46286**.

Vea los Términos y Condiciones para teléfonos móviles en [engagedrx.com/pghd](http://engagedrx.com/pghd).

Pueden aplicar tarifas de mensajes y datos. La frecuencia de los mensajes puede variar. Envíe el texto HELP (AYUDA) para obtener información, STOP (PARAR) para dejar de recibir mensajes.

Puede encontrar la Política de Privacidad de Pfizer en [pfizer.com/privacy](http://pfizer.com/privacy).

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

En estudios de NGENLA en niños con deficiencia de la hormona del crecimiento (DHC), los efectos secundarios incluyeron reacciones en el área de la inyección, como dolor, hinchazón, erupción, picor o sangrado. Otros efectos secundarios fueron resfriado común, dolor de cabeza, fiebre (temperatura alta), recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), tos, vómitos, disminución de niveles de hormonas tiroideas, dolor estomacal, erupción o dolor de garganta.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la [Información de Prescripción completa](#).



No es un paciente real.

**ngenla™**  
(somatrogan-ghla) injection



## ENCUENTRE APOYO EN EL PFIZER BRIDGE PROGRAM

Si su médico ha recetado NGENLA, el Pfizer Bridge Program puede brindarle apoyo de varias maneras:

- Adiestramiento con el dispositivo (en el hogar o virtual) por personal de enfermería experto
- Asistirle para entender el proceso de la aseguradora
- Hacer arreglos para el primer envío de NGENLA de la farmacia y atender asuntos que puedan causar retrasos de la farmacia o interrupciones del tratamiento
- Proveer a pacientes elegibles con seguro comercial asistencia económica y ahorros

El programa incluye a un Consultor de Atención para el Paciente. Este trabajará directamente con su médico, el seguro y la farmacia para ayudar a que su hijo o hija se inicien en NGENLA lo antes posible.

---


**Comuníquese con el Pfizer Bridge Program llamando al 1-800-645-1280**

---

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

Un profesional de la salud le ayudará con la primera inyección. También, le dará adiestramiento respecto a cómo inyectar NGENLA.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la Información de Prescripción completa.





#### ES HORA DEL ESPECTÁCULO

Unir la inyección semanal con el tiempo familiar de ver TV puede ayudar a que su hijo o hija experimenten un tiempo de relajación.

#### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD SELECCIONADA

No debe usar la hormona del crecimiento en niños una vez hayan cerrado las placas de crecimiento.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la [Información de Prescripción completa](#).



## INDICACIÓN

NGENLA es un producto recetado para el tratamiento del retraso del crecimiento en niños de 3 años o más que no producen suficiente hormona del crecimiento por sí solos. Este padecimiento se conoce como deficiencia de la hormona del crecimiento - DHC (GHD, por sus siglas en inglés).

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No debe usar la hormona del crecimiento en niños una vez una vez hayan cerrado las placas de crecimiento.

No debe usar la hormona del crecimiento en niños con algunos tipos de problemas visuales causados por la diabetes (retinopatía diabética).

No debe usar la hormona del crecimiento en niños con cáncer u otros tumores.

No debe usar la hormona del crecimiento en niños gravemente enfermos debido a algunos tipos de cirugía de corazón o estómago, trauma o problemas respiratorios.

No debe usar la hormona del crecimiento en niños con el síndrome de Prader-Willi que están muy sobrepeso o tienen problemas respiratorios, incluida apnea del sueño.

No debe usar NGENLA en niños que han presentado una reacción alérgica a somatotropina o a algún ingrediente de NGENLA. Busque atención médica inmediata en caso de una reacción alérgica.

Algunos niños han desarrollado diabetes mellitus cuando usan la hormona del crecimiento. Puede ser necesario ajustar la dosis de los medicamentos contra la diabetes durante el tratamiento con NGENLA. Deben vigilarse minuciosamente los niños que reciben NGENLA junto con terapia de glucocorticoides y/u otros medicamentos que el cuerpo procesa de la misma manera.

En sobrevivientes de cáncer en la niñez, el tratamiento con la hormona del crecimiento puede aumentar la probabilidad de un tumor nuevo, en particular, algunos tumores cerebrales benignos (no cancerosos). Esta probabilidad puede ser más alta en niños que recibieron radiación al cerebro o la cabeza. El profesional de la salud de su hijo o hija debe verificar la posibilidad de la recurrencia de cáncer o un tumor.

Los niños tratados con la hormona del crecimiento han presentado aumento de presión en el cerebro. Si su hijo o hija presenta dolores de cabeza, problemas visuales, náuseas (sensación de vomitar) o vómitos, comuníquese con el profesional de la salud de su hijo o hija.

Consulte la Información de Seguridad Importante en la próxima página  
y la [Información de Prescripción completa](#).



## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

NGENLA puede disminuir los niveles de las hormonas tiroideas. Una disminución de los niveles de las hormonas tiroideas puede cambiar cuán bien NGENLA funciona. El profesional de la salud de su hijo o hija le hará análisis de sangre para verificar los niveles de hormonas de su hijo o hija.

Se debe examinar con regularidad a los niños tratados con la hormona del crecimiento por la posibilidad de niveles séricos bajos de cortisol y/o la necesidad de aumentar la dosis de los glucocorticoides que usan.

En niños que experimentan crecimiento rápido, puede ocurrir desarrollo o empeoramiento de la curvatura de la columna vertebral. Esto también se conoce como escoliosis. Se deben vigilar regularmente a los pacientes con escoliosis para asegurar que la escoliosis no empeore durante la terapia con la hormona del crecimiento.

Use un área distinta del cuerpo para cada inyección. Esto puede ayudar a evitar problemas de la piel como bultos o dolor.

El tratamiento con la hormona del crecimiento puede causar dolor estomacal (abdominal) grave y constante. Esto pudiera ser signo de pancreatitis. Infórmale al profesional de la salud de su hijo o hija el surgimiento de dolor estomacal (abdominal) nuevo.

En estudios de NGENLA en niños con deficiencia de la hormona del crecimiento (DHC), los efectos secundarios incluyeron reacciones en el área de la inyección, como dolor, hinchazón, erupción, picor o sangrado.

Otros efectos secundarios fueron resfriado común, dolor de cabeza, fiebre (temperatura alta), recuento bajo de glóbulos rojos (anemia), tos, vómitos, disminución de niveles de hormonas tiroideas, dolor estomacal, erupción o dolor de garganta.

Un profesional de la salud le ayudará con la primera inyección. También, le dará adiestramiento respecto a cómo inyectar NGENLA.

Solo con receta

Consulte la Información de Seguridad Importante en la página anterior  
y la [Información de Prescripción completa](#).





No es un  
paciente real.

## UNA VEZ POR SEMANA

### ¡COMENCEMOS A CRECER...JUNTOS!

Inscríbase en el **programa del Navegador de NGENLA** en línea y reciba consejos y recursos que le ayudarán a usted y a su hijo o hija en su trayectoria de tratamiento.

Si tiene otras preguntas sobre NGENLA, hable con su médico o enfermero.

Para obtener más información sobre NGENLA visite **NGENLA.com**.

Consulte la Información de Seguridad Seleccionada a lo largo de este folleto y la **Información de Prescripción completa**.



PP-SMT-USA-0365

© 2024 Pfizer Inc.

Derechos reservados.

Impreso en EE. UU./mayo 2024

